Weissachmühle

Futtersorte	Alpenland 16	Alpenland 18	Alpenland Lein	Alpen-Smart Energy	Alpen-Smart Lino
	18% Two4Cow-Sun	**23% Two4Cow-Sun**	**mit 6% extrudierter Leinsaat und 11,5% Two4Cow-Sun**	**mit MetaSmart® Dry und 16% Two4Cow-Sun**	**mit MetaSmart® Dry, 6% extrudierter Leinsaat und 15% Two4Cow-Sun** **Mischung auf Bestellung**
Zusammensetzung:			**Anteile in %**		
	Mais; Rapsextraktionsschrot-futter; **Rapskuchen, druckhydrothermisch behandelt (Two4CowSun); Sonnen blumenkuchen, druckhydrothermisch behandelt (Two4Cow-Sun)**; Gerste; Maiskleberfutter; Weizengrieß-kleie; Rübenmelasseschnitzel, getrocknet; Rübenmelasse; Calciumcarbonat; Natriumchlorid	Mais; Rapsextraktionsschrot-futter; **Rapskuchen, druckhydrothermisch behandelt (Two4CowSun); Sonnen blumenkuchen, druckhydrothermisch behandelt (Two4Cow-Sun)**; Gerste; Maiskleberfutter; Weizengrieß kleie; Rübenmelasseschnitzel, getrocknet; Rübenmelasse; Calciumcarbonat; Natriumchlorid	Mais; Maiskleberfutter; Weizengrießkleie; Gerste; Rübenmelasseschnitzel, getrocknet; Rapsextraktions schrotfutter; **Leinsaat, aufgeschlossen; Rapskuchen, druckhydrothermisch behandelt (Two4CowSun); Sonnen-blumenkuchen, druckhydrothermisch behandelt (Two4Cow-Sun)**; Rapsextraktionsschrot, wärmebehandelt; Rübenmelasse; Calciumcarbonat; Natriumchlorid	Mais; Gerste; Rapskuchen, druckhydrothermisch behandelt; Sonnenblumenkuchen, druckhydrothermisch behandelt **(Two4Cow-Sun)**; Weizengrießkleie; Rapsextraktions-schrotfutter; Maiskleberfutter; Rübenmelasseschnitzel, getrocknet; Rübenmelasse; Calciumcarbonat; MetaSmart® Dry; Natriumchlorid	Mais; Maiskleberfutter; Gerste; Weizen-grießkleie; Rapskuchen, druckhydrothermisch behandelt; Sonnen-blumenkuchen, druckhydrothermisch behandelt **(Two4Cow-Sun)**; Leinsaat, aufgeschlossen; Rapsextraktionsschrot, wärmebehandelt; Rübenmelasseschnitzel, getrocknet; Rübenmelasse; Calciumcarbonat; MetaSmart® Dry; Natriumchlorid
analytische Bestandteile und Gehalte:					
Rohprotein %	**16**	**18**	**16**	**15**	**15**
Energie MJ NEL/kg	**7,5**	**7,5**	**7,7**	**7,5**	**7,8**
Rohfett %	**5,0**	**5,2**	**6,5**	4,6	6,7
Rohfaser %	**7,7**	**8,6**	**7,4**	6,7	6,9
Rohasche %	**5,7**	**5,8**	**5,5**	4,8	5,3
Calcium %	**0,8**	**0,7**	**0,6**	0,6	0,6
Phosphor %	**0,6**	**0,7**	**0,6**	0,5	0,5
Natrium %	**0,2**	**0,2**	**0,2**	0,2	0,2
nXP g/kg	**175**	**180**	**168**	170	170
RNB g/kg	**-2**	**0**	**-1**	-3,2	-3,2
Zusatzstoffe je kg:					
Isopropylester des Hydroxyanalogs von Methionin (3c309) g				2,3	2,3

heumilchtauglich *	x	x	x	x	x

Hinweise zur Berechnung der Stoffstrombilanz:

Stickstoffgehalt (N) in % = Rohproteingehalt in % geteilt durch 6,25

Phosphatgehalt (P_2O_5) in % = Phosphorgehalt in % multipliziert mit 2,291

Weitere Informationen zur Stoffstrombilanz finden Sie unter www.weissachmuehle.de

Alle Futtermittel sind geeignet zur Herstellung gentechnikfr Mischungen entsprechen aktuellen Beispielen. Zusammensetzung und Nährstoffgehalte siehe Lieferschein.

01-10-26