

	Basis-Linie			Spezial-Heumilch-Linie						HKT-Flocken-Linie				
Futtersorte	MVF 16/4	MVF 18/4	MVF 20/4	MVF Maispellets	XF-Spezial	MVF Winter Plus	Lakta Plus	nXP-Pellets	Energie kompakt	HKT Flocken 14	HKT 16/4	HKT 18/4	HKT Flocken 18	HKT E
Beschreibung	Energiestufe IV	Energiestufe IV	Energiestufe IV	75% Mais und 7,4 MJ NEL	rohfaserreiche Kleie	energiereiches Milchleistungsfutter mit 1,7% Pansenpuffer	mit Amaferm fördert die Faserverdauung	30 % Protein + geschütztes Protein	extrudierte Leinsaat und 8,0 MJ NEL	0% Melasseschnitzel 7,3 MJ NEL	0 % Melasseschnitzel 7,0 MJ NEL	0 % Melasseschnitzel 7,0 MJ NEL	0% Melasseschnitzel 7,3 MJ NEL	0% Melasseschnitzel 7,3 MJ NEL
Zusammensetzung:	Anteile in %													
Maisflocken										30,0			30,0	50,0
Gerstenflocken										29,0			28,0	48,0
Körnermais	21,0	22,0	15,0	75,0	18,0	33,0	34,0		40,0	5,2	35,0	25,0		
Gerste	8,0	5,0	6,5			8,0	6,0		7,3	2,0		3,0		
Maisleberfutter	20,2	12,7	16,0			16,3	11,0	0,0	10,7	7,0	18,0	18,0		
Rapsextraktionsschrotfutter	7,5	12,7	21,0			10,0	8,0	45,0		11,0	16,0	18,0	18,0	
Sojaextraktionsschrot (QS-Soja plus)							4,0	10,0					3,5	
Getreidetrockenschlempe	7,0	13,5	13,0			11,2	3,5	17,5		2,4		6,5	7,6	
Rübenmelasseschnitzel, getrocknet	4,0	4,0		20,0	8,0	3,5	10,0		8,5					
Rapsextraktionsschrot, wärmebehandelt						3,8	14,0	10,0	8,0				3,5	
Leinsaat, aufgeschlossen							3,0		12,0					
Weizenkleie	1,3	1,3	1,5		42,0	0,0				0,0	2,0	1,8		
Weizengrießkleie	27,0	24,5	23,0		13,0	8,7	1,9	13,0	9,6	9,0	25,0	23,7	5,0	
Haferschälkleie	3,0	0,0	0,0		16,0									
Rübenmelasse	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,4	3,0	3,0	3,8	2,0
Calciumcarbonat	0,7	1,0	0,7	1,5		1,2	1,2	1,2	0,6	0,3	0,7	0,7	0,5	
Magnesiumoxid						0,5								
Natriumcarbonat						0,4								
Natriumchlorid	0,3	0,3	0,3	0,5		0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,1	
Kalkalgen						0,1								
Amaferm® (4a2l)							0,1							

analytische Bestandteile und Gehalte:														
Rohprotein %	16,0	18,0	20,0	8	10	17	18	30	14	14	16	18	18	9
Energie MJ NEL/kg	7,0	7,0	7,0	7,4	6,1	7,2	7,5	7,1	8,0	7,3	7,0	7,0	7,3	7,3
Rohfett %	3,8	4,0	2,9	3,4	3,1	3,8	4,5	4,0	7,7	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Rohfaser %	7,3	7,5	7,8	5,0	12,5	6,3	7,1	9,7	6,3	5,9	7,3	7,5	6,4	4,2
Rohasche %	5,8	6,2	6,2	5,3	4,9	7,0	6,3	7,7	5,1	3,9	5,4	5,8	4,5	2,2
Calcium %	0,5	0,6	0,5	0,9	0,2	0,7	0,8	0,9	0,5	0,3	0,6	0,5	0,4	0,1
Phosphor %	0,6	0,7	0,8	0,3	0,7	0,6	0,6	1,0	0,5	0,5	0,7	0,7	0,6	0,3
Natrium %	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0
nXP g/kg	160,0	165,0	170	150	130	170	185	215	155	160	160	165	175	150
RNB g/kg	0,0	2,4	4,8	-11,2	-4,8	0,0	-0,8	13,6	-2,4	-3,2	0,0	2,4	0,8	-8,0

heumilchtauglich *	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Hinweise zur Berechnung der Stoffstrombilanz:

Stickstoffgehalt (N) in % = Rohproteingehalt in % geteilt durch 6,25

Phosphatgehalt (P2O5) in % = Phosphorgehalt in % multipliziert mit 2,291

Weitere Informationen zur Stoffstrombilanz finden Sie unter www.weissachmuehle.de

Alle Futtermittel sind geeignet zur Herstellung gentechnikfreier Lebensmittel

Mischungen entsprechen aktuellen Beispielen. Zusammensetzung und Nährstoffgehalte siehe Lieferschein.